

Laguna de LA NAVA

Torredonjimeno, Jaén



Laguna de Las Navas ([www.juntadeandalucia.es\(medioambiente, 2005\)](http://www.juntadeandalucia.es(medioambiente, 2005)))

1 Localización

Nombre del elemento: **Laguna de LA NAVA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Complejo de Lagunas de Martos (La Nava)**

Municipio: **Torredonjimeno**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **404848.452** Y: **4186214.202** Huso: **30** Altitud: **380 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Laguna

4 Descripción

Se sitúa a un kilómetro al sureste de la cortijada de La Nava en una zona de divisoria hidrográfica entre el arroyo de Torre Alcázar al norte y otros cauces afluentes del arroyo Salado que se dirigen hacia el sur y están encajados a cotas mas bajas.

La superficie de su cubeta es de 3,45 Ha en una cuenca de 58,34 Ha.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Regadío

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Aceptable

9 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios))

10 Otra información

Descripción hidrogeológica

La laguna se asienta sobre las margas blancas del mioceno de baja permeabilidad. En cambio, si presentan cierta permeabilidad las evaporitas triásicas que con procesos de karstificación, constituyen un acuífero heterogéneo que no esta conectado con el vaso lagunar. Este se comporta como un humedal estacional de aguas dulces, lo que esta en concordancia con la ausencia de aportaciones subterráneas en su mantenimiento, aunque sus aguas pueden ser persistentes en épocas de elevada pluviometría. Por lo tanto, la laguna de La Nava se puede considerar como una laguna de recarga en la que el aporte hídrico se produce por precipitación y escorrentía superficial en la cuenca vertiente. La infiltración esta bastante limitada por la baja permeabilidad de las margas blancas.

Otra información

Actualmente las zonas más someras del humedal se roturan habitualmente, plantando en ellas cereal y leguminosas. Incluso se han intentado implantar el olivar, aunque sin éxito debido a la inundación recurrente.

Este humedal estacional como integrante de un complejo de varias lagunas constituye una zona tanto de reproducción, como de descanso y alimentación para las aves acuáticas.

11 Nombre del autor/es de la ficha

www.juntadeandalucia.es/medioambiente

(14-10-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.